

Technische fiche A02 Akkerbloemen



SAMENSTELLING

Agrostemma githago (bolderik)
 Anthemis cotula (stinkende kamille)
 Centaurea cyanus (korenbloem)
 Glebionis segetum (gele ganzenbloem)
 Legousia speculum-veneris (groot spiegelklokje)
 Papaver rhoeas (grote klaproos)



Kenmerken	Inheems kleurrijk en bloemrijk éénjarig mengsel. In het voorjaar ingezaaid kan dit mengsel reeds na 6 tot 8 weken bloeien. Geschikt als tijdelijke oplossing, aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.
Volwassen hoogte	60-100 cm
Toepassing	Geschikt voor de meeste gronden (behalve heel natte en heel schrale (arme) gronden). Ideaal als tijdelijke oplossing voor braakliggende gronden, bermen, werven, educatieve projecten, demonstratiepercelen, akkerranden, tuinen & parken en historische graanakkers.
Bodemtype/habitat	Perfect voor zand-, zandleem-, leem-, klei- en humusrijke bodem.
Standplaats	Zonnig
Zaaidichtheid	2,5 g/m ²
Zaaiperiode	Maart, april, mei, juni, september, oktober
Bloeiperiode	Mei, juni, juli, augustus, september
Maaibeheer	1x per jaar in oktober

Voorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Indien er op het perceel voordien veel onkruid staat dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan u best twee weken wachten nadat u de grond voor het eerst bewerkt hebt.



Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg en zaait pas nadien het zaadmengsel in – dit zonder de bodem opnieuw te bewerken en om te gooien.

Inzaaien

De zaden mengen met rivierzand (1kg zaad voor 10kg of meer zand) en breedwerpig zaaien, daarna licht inwerken voor een goed contact met de grond.

De zaden mogen **NIET** afgedekt worden met enkele cm substraat, hooguit enkele mm.

Niet bemesten: geen compost aanbrengen.

De voorkeursperiode van inzaaien ligt tussen maart en begin mei of van eind augustus tot begin november. Bij combinatie met andere mengsels niet te dicht inzaaien, maximaal 20-25% van de hoeveelheid van het andere mengsel.

Zaaidichtheid 2,5g/m²

Maaibeheer

Het akkerbloemenmengsel A02 slechts 1x in de herfst of de winter maaien, nadat de zaden goed zijn afgerijpt.

Na het maaien kan het maaisel 2-3 dagen blijven liggen en worden afgevoerd.

Maaien gebeurt bij voorkeur met een messenbalk of bosmaaier.

Na het eerste jaar kan de grond wat oppervlakkig (max 10cm diep) worden “verstoord” na het maaien, na het tweede jaar de grond opnieuw omwerken en eventueel wat bijzaaien.