

Technische fiche B04

Mengsel voor schrale, droge neutrale of kalkrijke (zand)grond



SAMENSTELLING

Agrimonia eupatoria (gewone agrimonie)
 Agrimonia procera (welriekende agrimonie)
 Anchusa officinalis (gewone ossentong)
 Anthyllis vulneraria (wondklaver)
 Barbarea vulgaris (barbarakruid)
 Briza media (bevertjes)
 Campanula persicifolia (prachtklokje)
 Campanula rapunculoides (akkerklokje)
 Campanula rapunculus (rapunzelklokje)
 Campanula rotundifolia (grasklokje)
 Campanula trachelium (ruig klokje)
 Centaurea scabiosa (grote centaurie)
 Cichorium intybus (wilde chicorei)
 Crepis biennis (groot streepzaad)
 Dianthus deltoides (steenanjer)
 Galium verum (echt walstro)
 Geranium pratense (beemdooievaarsbek)
 Isatis tinctoria (wede)
 Knautia arvensis (beemdkroon)
 Leontodon hispidus (ruige leeuwetand)
 Origanum vulgare (wilde marjolein)
 Plantago media (ruige weegbree)



Reseda lutea (wilde reseda)
 Reseda luteola (wouw)
 Rhinanthus minor (kleine ratelaar)
 Salvia pratensis (veldsalie)
 Sanguisorba minor (kleine pimpernel)
 Saxifraga granulata (knolsteenbreek)
 Scabiosa columbaria (duifkruid)
 Silene vulgaris (blaassilene)
 Stachys officinalis (betonie)
 Tragopogon porrifolius (paarse morgenster)
 Tragopogon pratensis pratensis (gele morgenster)
 Verbascum nigrum (zwarte toorts)
 Verbena officinalis (ijzerhard)

Kenmerken	Het eerste jaar weinig bloei, daarna ingetogen bloei van vaste planten Voor schrale, zanderige, liefst kalkrijke grond. Neutrale gronden kunnen ook, maar zeker niet op zure grond Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.
Volwassen hoogte	30-100 cm
Toepassing	Schrale, zanderige, liefst kalkrijke grond. Neutrale gronden kunnen ook, maar zeker niet op zure grond!
Bodemtype/habitat	Zand, zandleem
Standplaats	Zonnig
Zaadichtheid	1,5g – 2g/m ²
Zaaiperiode	Maart, april mei – augustus, september, oktober
Bloeiperiode	Mei tot september
Maaibeheer	1 tot 2x per jaar

Voorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Indien er op het perceel voordien veel onkruid (brandnetels, distels, zuring, winde, enz.) staat dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan je best twee weken wachten nadat je de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg of geef je het een kopmaaibeurt (plantjes 'onthoofden' met grasmaaiër op de hoogste stand én met opvangbak) en zaait het zaadmengsel pas nadien in. Dit zonder de bodem opnieuw te bewerken.



Opgelet: Een kopmaaibeurt werkt niet bij de zgn. wortelonkruiden, deze verwijder je vooraf mét de wortel.

Inzaaien

De zaden mengen met rivierzand (1kg zaad voor 10kg of meer zand) en breedwerpig zaaien, daarna licht inwerken voor een goed contact met de grond.

De zaden mogen niet afgedekt worden met enkele cm substraat, hooguit enkele mm.

NIET bemesten en **GEEN** compost aanbrengen.

De voorkeursperiode van inzaaien ligt tussen maart en begin mei of van eind augustus tot begin november. Voor een kleurrijk resultaat vanaf het eerste jaar kan je het éénjarige akkerbloemenmengsel A02 mee inzaaien (maximaal 20%).

Zaadichtheid: 1,5-2 g/m²

Maaibeheer

Een vaste bloemenweide wordt 1-2x per jaar gemaaid eind juni en begin oktober, steeds met afvoeren van het maaisel.