

Technische fiche B05

Mengsel zonder grassen voor rijke grond in halfschaduw



SAMENSTELLING

Alliaria petiolata (look-zonder-look)
 Angelica sylvestris (gewone engelwortel)
 Anthriscus sylvestris (fluitekruid)
 Arctium lappa (grote klit)
 Campanula trachelium (ruig klokje)
 Chaerophyllum temulum (dolle kervel)
 Chelidonium majus (stinkende gouwe)
 Crepis capillaris (klein streepzaad)
 Digitalis purpurea (gewoon vingerhoedskruid)
 Eupatorium cannabinum (koninginnekruid)
 Filipendula ulmaria (moerasspirea)
 Geranium robertianum (robertskruid)
 Geum urbanum (geel nagelkruid)
 Heracleum sphondylium (bereklaauw)
 Lapsana communis (akkerkool)
 Myosotis sylvatica (bosvergeet-mij-nietje)
 Prunella vulgaris (brunel)
 Scrophularia nodosa (knopig helmkruid)
 Silene dioica (dagkoekoeksbloem)
 Stachys sylvatica (bosandoorn)
 Tanacetum vulgare (boerewormkruid)
 Teucrium scorodonia (valse salie)
 Torilis japonica (heggendoornzaad)
 Valeriana officinalis (valeriaan)
 Vicia cracca (vogelwikke)




Kenmerken	Weinig bloei in het eerste jaar. Ideaal voor bosranden. Verdraagt enige verstoring van de grond na het inzaaien. Trekt bijen en vlinders aan.
Volwassen hoogte	30-120cm
Toepassing	Voor matig tot redelijk voedselrijke grond
Bodemtype/habitat	Zandleem / humusrijk
Standplaats	Voor halfschaduw, bv bosranden, minimaal 4 tot 6 uur zon per dag
Zaaidichtheid	1,5-2g/m ²
Zaaiperiode	Midden maart tot juni, vanaf eind augustus tot oktober
Bloeiperiode	Mei tot september
Maabeheer	2 x in juli en begin oktober (herfst).

Voorbereiding terrein

Verwijder zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.
Om dit succesvol te doen bestaan er verschillende technieken.

De bestaande grasmat afschrapen en afvoeren of herverdelen over een ander deel van het terrein. Dit is de beste methode want hierdoor verwijdert u eveneens het vruchtbaarste deel van de grond.

Indien er op het perceel voordien veel 'lastig' onkruid stond (brandnetels, zuring, distels, winde,...) dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.



Concreet kan je best twee weken wachten nadat je de grond voor het eerst bewerkt hebt. Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg of geef je het een kopmaaibeurt (plantjes 'onthoofden' met grasmaaier op de hoogste stand én met opvangbak) en zaai het zaadmengsel pas nadien in. Dit zonder de bodem opnieuw te bewerken.

Opgelet: Een kopmaaibeurt werkt niet bij de zgn. wortelonkruiden, deze verwijder je vooraf mét de wortel.

Inzaaien

De zaden mengen met rivierzand (1kg zaad voor 10kg of meer zand) en breedwerpig zaaien met de hand, daarna licht inwerken/harken voor een goed contact met de grond.

De zaden mogen **NOOIT** afgedekt worden met enkele cm substraat, hoogstens enkele mm.
De bloemenweide mag **NOOIT** bemest worden.

Bij voorkeur inzaaien in het najaar of in het vroege voorjaar.

Voor een kleurrijk resultaat vanaf het eerste jaar kan het mengsel A02 akkerbloemen mee ingezaaid worden (max 20%).

Zaaidichtheid: 1,5-2g/m²

Onderhoud – maaien

Twee keer per jaar maaien in juli en begin oktober. Laat het maaisel enkele dagen liggen zodat het rijpe zaad er kan afvallen en voer dan het maaisel af (om verrijking van de grond te vermijden).