

Technische fiche B06 Boomgaardmengsel



SAMENSTELLING

Achillea millefolium (duizendblad)
 Agrostemma githago (bolderik)
 Campanula rapunculoïdes (akkerklokje)
 Centaurea cyanus (korenbloem) Syn. Cyanus segetum
 Centaurea jacea (echt knoopkruid)
 Cichorium intybus (wilde cichorei)
 Coriandrum sativum (koriander)
 Daucus carota (wilde peen)
 Echium vulgare (slangenkruid)
 Foeniculum vulgare (venkel)
 Geranium pyrenaicum (bermooievaarsbek)
 Glebionis segetum (gele ganzebloem)
 Leontodon hispidus (ruige leeuwentand)
 Leucanthemum vulgare (wilde margriet)
 Malva moschata (muskuskaasjeskruid)
 Malva sylvestris (groot kaasjeskruid)
 Origanum vulgare (wilde marjolein)



Papaver rhoeas (grote klaproos)
 Reseda lutea (wilde reseda)
 Silene flos-cuculi (echte koekoeksbloem) Syn.
 Lychnis flos-cuculi
 Silene latifolia alba (avondkoekoeksbloem)
 Silene vulgaris (blaassilene)
 Tragopogon pratensis (gele morgenster)
 Verbascum thapsus (koningskaars)

Kenmerken	Bloemrijk vanaf het eerste jaar. Het wordt voornamelijk toegepast voor de stroken tussen de fruitbomen. Mengsel met éénjarigen, tweejarigen en vaste planten De soorten in dit mengsel, dat werd ontwikkeld door de Universiteit van Louvain-la-Neuve, zijn waardplanten voor nuttige insecten, waardoor geïntegreerde plaagbestrijding in boomgaarden bevordert. Trekt bijen, vlinders en vogels aan.
Volwassen hoogte	30 – 120cm
Toepassing	Boomgaarden, tussen bomenrijen, in de fruit- en groenteteelt, agroforestry en bij opstart van voedselbossen.
Bodemtype/habitat	Droge tot iets frisse zand- en (zand)leembodems
Standplaats	Zonnig, halfschaduw
Zaaidichtheid	2,5 g/m ²
Zaaiperiode	Maart tot mei / augustus tot oktober
Bloeiperiode	Mei tot september
Maaibeheer	Eerste jaar 1x in oktober, daarna 1 tot 2x per jaar in juli en oktober met afvoeren van het maaisel

Vorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden. Indien er op het perceel voordien veel onkruid (brandnetels, distels, zuring, winde, enz.) staat dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan je best twee weken wachten nadat je de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg of geef je het een kopmaaibeurt (plantjes 'onthoofden' met grasmaaier op de hoogste stand én met opvangbak) en zaait het zaadmengsel pas nadien in. Dit zonder de bodem opnieuw te bewerken.



⚠️ Opgelet: Een kopmaaibeurt werkt niet bij de zgn. wortelonkruiden, deze verwijder je vooraf mét de wortel.

Inzaaien

De zaden mengen met rivierzand (1kg zaad voor 10kg of meer zand) en breedwerpig zaaien, daarna licht inwerken voor een goed contact met de grond.

De zaden mogen **NOOIT** afgedekt worden met enkele cm substraat, hooguit enkele mm.

Niet bemesten of geen compost aanbrengen.

Verdraagt een lichte verstoring van de bodem na het zaaien van de bloemenweide.

De voorkeursperiode van inzaaien ligt tussen maart en begin mei of van eind augustus tot begin november.

Zaaidichtheid: 2,5 g/m²

Maaibeheer

Eerste jaar enkel maaien in oktober, daarna 1 tot 2 keer per jaar juli en oktober (steeds met afvoeren van het maaisel).

Gefaseerd maaibeheer is altijd een meerwaarde voor de biodiversiteit, maar zeker bij dit mengsel aan te raden zodat bestuivers altijd voldoende voedsel en beschutting vinden.

Laat dus bij elke maaibeurt 15-30% van de vegetatie staan.

Maai deze delen wel weer bij een volgende maaibeurt.

