

Technische fiche B08

Mengsel voor (weg)bermen en openbaar groen vaste bloemenweide zonder grassen



SAMENSTELLING

Achillea millefolium (gewoon duizendblad)
 Agrimonia eupatoria (gewone agrimonie)
 Barbarea vulgaris (gewoon barbarakruid)
 Campanula rotundifolia (grasklokje)
 Centaurea cyanus - syn. Cyanus segetum (korenbloem)
 Centaurea jacea (echt knoopkruid)
 Cichorium intybus (wilde cichorei)
 Daucus carota (wilde peen)
 Echium vulgare (slangenkruid)
 Galium mollugo (glad walstro)
 Hypericum perforatum (sint-janskruid)
 Hypochaeris radicata (gewoon biggenkruid)
 Jasion montana (zandblauwtje)
 Knautia arvensis (beemdkroon)
 Leucanthemum vulgare (gewone margriet)
 Linaria vulgaris (vlasbekje)
 Lotus corniculatus (gewone rolklaver)
 Medicago lupulina (hopklaver)
 Papaver dubium (bleke klaproos)
 Papaver rhoeas (grote klaproos)
 Pastinaca sativa (pastinaak)
 Plantago lanceolata (smalle weegbree)
 Prunella vulgaris (brunel)



Rumex acetosa (veldzuring)
 Rumex acetosella (schapezuring)
 Scorzoneroïdes autumnalis (vertakte leeuwentand)
 Silene dioica (dagkoekoeksbloem)
 Silene latifolia ssp. Alba (avondkoekoeksbloem)
 Silene vulgaris (blaassilene)
 Trifolium arvense (hazenpootje)
 Verbascum nigrum (zwarte toorts)

Kenmerken	Bloemrijk vanaf het eerste jaar. Mengsel van éénjarigen, tweejarigen en vaste planten met bodemversterkende eigenschappen. Geeft snelle grondbedekking. Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.
Volwassen hoogte	25cm tot 1m
Toepassing	Wegbermen en openbaar groen
Bodemtype/habitat	Zandleem, leem
Standplaats	Zonnig
Zaadichtheid	1,5g tot 2,5g/m ²
Zaaiperiode	Maart, april, mei, augustus, september, oktober
Bloeiperiode	Mei tot september
Maibeheer	Eerste jaar enkel maaien aan het begin van de herfst, daarna 1 tot 2x per jaar, aan het begin van de zomer en het aan het einde van de herfst.

Vorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Indien er op het perceel voordien veel onkruid staat dan wordt dit best twee of drie keer herhaald, met een tussenperiode van 2-3 weken.

Hierbij steeds zorg dragen voor een oppervlakkige bodembewerking, dit om te vermijden dat onkruidzaden uit diepere grondlagen naar boven worden gebracht.



Een grondige voorbereiding van de bodem is van zeer groot belang voor een succesvolle aanleg van een bloemenweide, zaaien in een terrein met een grote aanwezigheid van onkruid(zaden) kan nefast zijn voor de ontwikkeling van de bloemenweide.

Inzaaien

De zaden mengen met rivierzand (1kg zaad voor 10kg of meer zand) en breedwerpig zaaien, daarna licht inwerken voor een goed contact met de grond.

De zaden mogen niet afgedekt worden met enkele cm substraat, hooguit enkele mm.

Niet bemesten of aanbrengen van compost.

Bij voorkeur inzaaien van eind augustus tot begin november of in het vroege voorjaar (maart – midden juni).

Aanbevolen zaaidichtheid: 1,5-2,5 g/m²

Maaibeheer

In het eerste jaar na zaaien maaien in oktober, daarna kan 1-2x per jaar worden gemaaid (eind juni en in oktober), steeds met afvoeren van het maaisel.



Maaien gebeurt bij voorkeur met een messenbalk of bosmaaier, gebruik van een klepelmaaier is sterk afgeraden wegens versnippering van het maaisel wat voor vervilting zorgt. Bij klepelmaaien met afzuiging worden insecten ook zwaar getroffen.