

Technische fiche B10

Eetbaar bloemenmengsel



SAMENSTELLING

Achillea millefolium (duizendblad)
 Alliaria petiolata (look-zonder-look)
 Angelica archangelica (grote engelwortel)
 Barbarea vulgaris (gewoon barbarakruid)
 Campanula rapunculoides (akkerklokje)
 Cardamine pratensis (pinksterbloem)
 Centaurea cyanus (korenbloem) Syn. Cyanus segetum
 Chamerion angustifolium (wilgeroosje)
 Chenopodium bonus-henricus (brave Hendrik)
 Syn. Blitum bonus-henricus
 Cichorium intybus (wilde cichorei)
 Crepis biennis (groot streepzaad)
 Daucus carota (wilde peen)
 Filipendula ulmaria (moerasspirea)
 Knautia arvensis (beemdkroon)
 Leucanthemum vulgare (wilde margriet)
 Malva moschata (muskuskaasjeskruid)
 Matricaria chamomilla (echte kamille)
 Oenothera biennis (middelste teunisbloem)
 Origanum vulgare (wilde marjolein)
 Papaver rhoeas (grote klaproos)



Pastinaca sativa subsp. Sativa (pastinaak)
 Plantago lanceolata (smalle weegbree)
 Rumex acetosa (veldzuring)
 Salvia pratensis (veldsalie)
 Sanguisorba minor (kleine pimpernel) Syn.
 Poterium sanguisorba
 Silene vulgaris (blaassilene)
 Stachys officinalis (betonie)
 Syn. Betonica officinalis
 Trifolium pratense (rode klaver)
 Valeriana officinalis (echte valeriaan)

Kenmerken	Het mengsel bevat een aantal éénjarigen, zodat ook in het eerste jaar al kan worden geplukt, vanaf het tweede en derde jaar na zaaien meest bloemrijke resultaat. Jaarlijks kan eruit worden geknipt of geplukt wat u wil. Dit mengsel is niet Bio-gecertificeerd.
Volwassen hoogte	30-120cm
Toepassing	Geschikt voor de meeste matig voedselrijke gronden die niet te droog, niet te nat en niet te schaduwrijk zijn
Bodemtype/habitat	Zandleem, leem / voedselbos or border
Standplaats	Zonnig
Zaaidichtheid	1,5-2,5g/m ²
Zaaiperiode	Maart, april, mei, augustus, september, oktober
Bloeiperiode	Mei – september
Maabeheer	1 tot 2x maaien per jaar met afvoeren van het maaisel


Vorbereitung terrain

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Indien er op het perceel voordien veel onkruid staat dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan u best twee weken wachten nadat u de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg en zaait pas nadien het zaadmengsel in – dit zonder de bodem opnieuw te bewerken en om te gooien.



Inzaaien

De zaden mengen met rivierzand (1kg zaad voor 10kg of meer zand) en breedwerpig zaaien, daarna licht inwerken voor een goed contact met de grond.

De zaden mogen niet afgedekt worden met enkele cm substraat, hooguit enkele mm.

Niet bemesten of aanbrengen van compost.

De grond niet verstoren na aanleg.

De voorkeursperiode van inzaaien ligt in het najaar van eind augustus tot begin november of in het voorjaar van maart tot begin mei.

Zaaidichtheid: 1,5-2,5g/m²

Maaibeheer

Het eerste jaar enkel maaien in oktober, daarna 1 tot 2x per jaar maaien (juli en oktober), steeds met afvoeren van het maaisel.