

## Technische fiche B11

### Doorzaaimengsel bestaande bloemenweide - vast zonder grassen

#### SAMENSTELLING

Achillea millefolium (duizendblad)  
 Centaurea jacea (knoopkruid)  
 Clinopodium vulgare (borstelkrans)  
 Daucus carota (wilde peen)  
 Galium mollugo (glad walstro)  
 Geranium pyrenaicum (bermooievaarsbek)  
 Leucanthemum vulgare (wilde margriet)  
 Lotus corniculatus (gewone rolklaver)  
 Malva moschata (muskuskaasjeskruid)  
 Origanum vulgare (wilde marjolein)  
 Plantago lanceolata (smalle weegbree)  
 Prunella vulgaris (gewone brunel)  
 Ranunculus acris (scherpe boterbloem)  
 Rumex acetosa (veldzuring)  
 Silene latifolia alba (avondkoekoeksbloem)  
 Silene vulgaris (blaassilene)  
 Trifolium pratense (rode klaver)



<b>Kenmerken</b>	Dit mengsel is samengesteld uit vaste planten en is te gebruiken in een bestaande bloemenweide (geen dichte grasmat) om de diversiteit aan bloemen te verhogen, zonder de bestaande vegetatie te vernietigen. In het eerste jaar na zaaien zal er weinig of geen bloei zijn, de vaste planten beginnen pas te bloeien in het tweede jaar na zaaien. Bijen- en vlinderplant.
<b>Volwassen hoogte</b>	15-70cm
<b>Toepassing</b>	Te gebruiken in een bestaande bloemenweide (geen dichte grasmat) om de diversiteit aan bloemen te verhogen, zonder bestaande vegetatie te vernietigen.
<b>Bodemtype/habitat</b>	Zandleem, leem
<b>Standplaats</b>	Zonnig
<b>Zaadichtheid</b>	3g/m <sup>2</sup>
<b>Zaaiperiode</b>	September, oktober (na de laatste maaibeurt en verticuteren)
<b>Bloeiperiode</b>	Mei, juni, juli, augustus, september
<b>Maaibeheer</b>	1 tot 2x per jaar OPGELET! In het voorjaar volgend op het zaaien moet er voor eind juni 2 à 3x worden gemaaid, dit om ervoor te zorgen dat de jonge zaailingen zich goed kunnen ontwikkelen. Daarna terug overgaan naar 1 à 2x maaien per jaar.

### **Vorbereiding terrein**

Zo kort mogelijk maaien van de bestaande vegetatie, **na maaien grondig verticuteren** van het perceel met uitkammen van de plantenresten.

De doelstelling hiervan is de bestaande zode te breken en plekken met naakte grond te creëren, nodig voor het kiemen en ontwikkelen van de zaden (streefdoel: 30-50% plekken met blote grond).

### **Inzaaien**

De zaden mengen met een ruime hoeveelheid zand (10kg tot een kruiwagen zand voor 1kg zaden) en uitstrooien over het terrein.



Daarna lichtjes aanharken en aandrukken voor een goed contact met de grond, de zaden mogen nooit afgedekt worden met enkele cm substraat, hoogstens enkele mm.

De bloemenweide mag **NOOIT** bemest worden.

### **Doorzaaien gebeurt in september of uiterlijk begin oktober**

Doorzaaien bij voorkeur in september, na maaien en verticuteren van het perceel (met afvoeren van het maaisel en plantenresten)

**Zaaidichtheid:** 3 g/m<sup>2</sup>

### **Onderhoud - maaien**

In het voorjaar volgend op het doorzaaien moet er voor eind juni 2 tot 3 maal worden gemaaid, dit om ervoor te zorgen dat de jonge zaailingen zich goed kunnen ontwikkelen.

Daarna kan terug worden overgegaan naar 1-2 maal maaien per jaar.

**Maaien gebeurt steeds met afvoeren van het maaisel.**