

## Technische fiche B12 Bijen- en vlindermengsel



### SAMENSTELLING

Agrostemma githago (bolderik)  
 Borago officinalis (komkommerkruid)  
 Centaurea cyanus (korenbloem)  
 Centaurea jacea (echt knoopkruid)  
 Cichorium intybus (wilde chicorei)  
 Clinopodium vulgare (borstelkrans)  
 Daucus carota (wilde peen)  
 Dipsacus fullonum (grote kaardebol)  
 Echinops sphaerocephalus (beklierde kogeldistel)  
 Echium vulgare (slangekruid)  
 Foeniculum vulgare (venkel)  
 Geranium pyrenaicum (bermooeivaarsbek)  
 Glebionis segetum (gele ganzebloem)  
 Leontodon hispidus (ruige leeuwetand)  
 Leucanthemum vulgare (wilde margriet)  
 Lotus corniculatus (gewone rolklaver)  
 Malva moschata (muskuskaasjeskruid)  
 Onobrychis viciifolia (esparcette)  
 Origanum vulgare (wilde marjolein)



Papaver rhoeas (grote klaproos)  
 Prunella vulgaris (brunel)  
 Reseda luteola (wouw)  
 Silene latifolia alba (avondkoekoeksbloem)  
 Silene vulgaris (blaassilene)  
 Silybum marianum (mariadistel)  
 Verbascum nigrum (zwarte toorts)

<b>Kenmerken</b>	De soorten in dit mengsel werden geselecteerd op hun aantrekkingskracht op bijen, hommels en vlinders. Mengsel van éénjarigen, tweekarigen en vaste planten, dus bloemrijk vanaf het eerste jaar.
<b>Volwassen hoogte</b>	15-120cm
<b>Toepassing</b>	Bedoeld voor tuinen, wijken en parkgebieden.
<b>Bodemtype/habitat</b>	Zandleem, leem
<b>Standplaats</b>	Zonnig
<b>Zaadichtheid</b>	2,5g/m <sup>2</sup>
<b>Zaaiperiode</b>	Maart tot mei – augustus tot oktober
<b>Bloeiperiode</b>	Mei tot september
<b>Maaibeheer</b>	1 tot 2x per jaar

### **Vorbereiding terrein**

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Indien er op het perceel voordien veel onkruid staat dan wordt dit best twee of drie keer herhaald, met een tussenperiode van 2-3 weken.

Hierbij steeds zorg dragen voor een oppervlakkige bodembewerking, dit om te vermijden dat onkruidzaden uit diepere grondlagen naar boven worden gebracht.



Een grondige voorbereiding van de bodem is van zeer groot belang voor een succesvolle aanleg van een bloemenweide, zaaien in een terrein met een grote aanwezigheid van onkruid(zaden) kan nefast zijn voor de ontwikkeling van de bloemenweide.

### **Inzaaien**

De zaden mengen met rivierzand (1kg zaad voor 10kg of meer zand) en breedwerpig zaaien, daarna licht inwerken voor een goed contact met de grond.

De zaden mogen **niet** afgedekt worden met enkele cm substraat, hooguit enkele mm.

### **Niet bemesten of aanbrengen van compost.**

Preferente periode voor inzaaien van eind augustus tot begin november of in het vroege voorjaar (maart – april)

**Aanbevolen zaaidichtheid:** 2,5 g/m<sup>2</sup>

### **Maaibeheer**

In het eerste jaar na zaaien maaien in oktober, daarna kan 1-2x per jaar worden gemaaid (eind juni en in oktober), steeds met afvoeren van het maaisel.

Maaien gebeurt bij voorkeur met een messenbalk of bosmaaier, gebruik van een klepelmaaier is sterk afgeraden.