

Technische fiche C03

Boomspiegelmengsel - mengsel voor bijzondere situaties



SAMENSTELLING

Achillea millefolium (gewoon duizendblad)
 Agrimonia eupatoria (agrimonie, gewone)
 Agrostemma githago (bolderik)
 Calendula arvensis (akkergoudsbloem)
 Centaurea cyanus - syn. Cyanus segetum (korenbloem)
 Clinopodium vulgare (borstelkrans)
 Geranium pyrenaicum (bermooievaarsbek)
 Glebionis segetum (gele ganzebloem)
 Leucanthemum vulgare (wilde margriet)
 Malva moschata (muskuskaasjeskruid)
 Origanum vulgare (wilde marjolein)
 Papaver rhoeas (grote klaproos)
 Prunella vulgaris (brunel)
 Silene dioica (dagkoekoeksbloem)
 Silene vulgaris (blaassilene)
 Stachys officinalis (betonie)



Kenmerken	Dit mengsel werd samengesteld voor gebruik onder boomspiegels en is dus ideaal voor een stedelijke omgeving. Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.
Volwassen hoogte	60-100 cm
Toepassing	Komt het best tot zijn recht op een rijkere grond (plantvak onder bomen).
Bodemtype/habitat	Zand, zandleem, leem, klei, humusrijk
Standplaats	Zon, halfschaduw
Zaaidichtheid	3g/m ²
Zaaiperiode	Maart tot mei – eind augustus tot half oktober
Bloeiperiode	Mei tot september
Maaibeheer	1 tot 2x per jaar

Vorbereiding terrein

Maak het substraat oppervlakkig fijn, indien de oppervlakte uit lavakorrels bestaat breng dan voor de inzaai een laag zaaigrond aan.

Inzaaien

Niet inzaaien in periode van vorst.

Kort na het aanplanten van de bomen, vanaf november.

Bij voorjaars-inzaai, de grond licht losmaken.



De zaden mengen met rivierzand (1kg zaad voor 10kg of meer zand) en breedwerpig zaaien, daarna licht inwerken voor een goed contact met de grond.

Als er een korrelig substraat aan de bodem ligt is het aanbevolen een fijner substraat in te mengen bij het zand als bijvoorbeeld rijpe compost.

De zaden mogen niet afgedekt worden met enkele cm substraat, hooguit enkel mm.

Niet bemesten of aanbrengen van compost.

Dit mengsel wordt bij voorkeur ingezaaid in het najaar (eind augustus tot begin november), daar verschillende soorten uit dit mengsel koudekiemers zijn.

De kiemrust wordt pas gebroken als er minstens vijf opeenvolgende dagen temperaturen van onder de 5°C zijn.

Opletten met begietingen van de jonge boomspiegels: vermijd harde waterstralen op het ingezaaide mengsel.

Gebruik bij voorkeur gietzakken, of begiet via een drainagebuis.

Je kan ook een jaar wachten na de aanplant voor de inzaai.

Aanbevolen zaaidichtheid: 3g/m²

Onderhoud – maaien

Eerste jaar enkel maaien aan het einde van de herfst, daarna 1-2 keer per jaar maaien aan het begin van de zomer en in de late herfst, met afvoeren van het maaisel.