

Technische fiche C06

Vlinderbloemigen mengsel- Groenbemester

Mengsel voor bijzondere situaties



SAMENSTELLING

Lotus corniculatus (gewone rolklaver)
 Medicago sativa (luzerne) Onobrychis viciifolia (esparcette)
 Trifolium incarnatum (inkarnaatklaver)
 Trifolium pratense (rode klaver)
 Trifolium repens (witte klaver)



Kenmerken	Meerjarig mengsel voornamelijk voor landschappelijke en agrarische toepassingen. Het vlinderbloemigen mengsel bevat groenbemesters en houdt stikstof vast in de bodem. Bij- en vlindervriendelijk.
Volwassen hoogte	15-55 cm
Toepassingen	Voor groenbemesting
Bodemtype/habitat	Zand, zandleem, leem, klei, humusrijk
Standplaats	Zon, halfschaduw
Zaaidichtheid	2g/m ²
Zaaiperiode	Maart tot juni – augustus tot oktober
Bloeiperiode	Mei tot september
Maaibeheer	1x per jaar

Vorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk de bestaande-vegetatie.

Indien er op het perceel voordien veel onkruid staat dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan je best twee weken wachten nadat je de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg of geef je het een kopmaaibeurt (plantjes 'onthoofden' met grasmaaier op de hoogste stand én met opvangbak) en zaait het zaadmengsel pas nadien in. Dit zonder de bodem opnieuw te bewerken.



Opgelet: Een kopmaaibeurt werkt niet bij de zgn. wortelonkruiden, deze verwijder je vooraf mét de wortel.

Inzaaien

De zaden mengen met rivierzand (1kg zaad voor 10kg of meer zand) en breedwerpig zaaien, daarna licht inwerken voor een goed contact met de grond. Je kan ook een zaaimachine gebruiken.

De zaden mogen **niet afgedekt worden** met enkele cm substraat, hooguit enkele mm.

Niet bemesten.

De voorkeursperiode van inzaaien ligt tussen midden maart en midden juni of vanaf eind augustus. Gebruik het maaisel van groenbemesters als mulch-materiaal of werk het in.

Zaaidichtheid: 2g/m²

Onderhoud – maaien

Jaarlijks 1x maaien in het najaar of inwerken als groenbemester.