

Technische fiche D01 50/50

Bloemrijk grasland - Mengsel voor grotere oppervlaktes



SAMENSTELLING

Bloemen

Achillea millefolium (gewoon duizendblad)
 Agrostemma githago (bolderik)
 Anthemis cotula (stinkende kamille)
 Centaurea cyanus (korenbloem)
 Centaurea jacea (echt knoopkruid)
 Clinopodium vulgare (borstelkrans)
 Crepis biennis (groot streepzaad)
 Daucus carota (wilde peen)
 Galium mollugo (glad walstro)
 Geranium pyrenaicum (bermooievaarsbek)
 Glebionis segetum (gele ganzebloem)
 Hypericum perforatum (Sint-Janskruid)
 Leucanthemum vulgare (wilde margriet)
 Lotus corniculatus (gewone rolklaver)
 Malva moschata (muskuskaasjeskruid)
 Origanum vulgare (wilde marjolein)
 Papaver rhoeas (grote klaproos)
 Plantago lanceolata (smalle weegbree)
 Prunella vulgaris (gewone brunel)
 Ranunculus acris (scherpe boterbloem)
 Silene flos-cuculi (echte koekoeksbloem)
 Silene latifolia alba (avondkoekoeksbloem)
 Silene vulgare (blaassilene)
 Tragopogon pratensis (gele morgenster) subsp.pratensis
 Trifolium pratense (rode klaver)



Grassen

Agrostis capillaris (gewoon struisgras)
 Festuca rubra commutata (gewoon rood zwenkgras)
 Poa pratensis (veldbeemdgras)
 Rhinanthus minor (kleine ratelaar)

Kenmerken	Meerjarig en éénjarig mengsel bestaande uit 50% grassen en 50% inheemse bloemen (vooral vaste planten). Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.
Volwassen hoogte	30-60 cm
Toepassing	Grote oppervlaktes
Bodemtype/habitat	Leem-zandleem
Standplaats	Zon, halfschaduw
Zaadichtheid	5g/m ²
Zaaiperiode	Februari tot april – augustus tot eind oktober
Bloeiperiode	Mei tot september
Maibeheer	De eerste keer maaien in oktober daarna 1 tot 2x per jaar

Vorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Om dit succesvol te doen bestaan er verschillende technieken:

- Bestaande grasmat afschrapen en afvoeren of herverdelen over een ander deel van het terrein. Dit is de beste methode want hierdoor verwijderd u eveneens het vruchtbaarste deel van de grond;
- De grond meerdere maanden afdekken met een ondoorzichtige folie of karton (hierdoor sterft alles af);
- De grond diep omploegen (grasmat minstens 30 cm onderspitten) – voor de winter;



⚠ Let op : indien er op het perceel voordien veel ‘lastig’ onkruid stond (brandnetels, zuring, distels, winde,...) dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan je best twee weken wachten nadat je de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg of geef je het een kopmaaibeurt (plantjes ‘onthoofden’ met grasmaaier op de hoogste stand én met opvangbak) en zaait het zaadmengsel pas nadien in. Dit zonder de bodem opnieuw te bewerken.

Opgelet: Een kopmaaibeurt werkt niet bij de zgn. wortelonkruiden, deze verwijder je vooraf mét de wortel.

Inzaaien

De zaden mengen met wat zand en uitstrooien over het terrein.

Daarna lichtjes aanharken en aandrukken voor een goed contact met de grond, de zaden mogen nooit afgedekt worden met enkele cm substraat, hoogstens enkele mm.

De bloemenweide mag NIET bemest worden.

De periode van inzaaien ligt tussen maart en half juni of van eind augustus tot eind oktober.

Een gedeelte van het mengsel zijn éénjarige bloemen, dit zorgt ervoor dat er het eerste jaar na zaaien ook al bloei is.

Zaaidichtheid: 5g/m²

Onderhoud – maaien

Enkel maaien in oktober in het eerste jaar na zaaien, daarna 1 of 2 keer maaien per jaar (begin juli en in oktober).

Bij voorkeur maaien met een messenbalk of bosmaaier (met grasmes), vermijd maaien met een klepelmaaier.

Steeds het maaisel afvoeren om verrijking van de bodem en vervilting te voorkomen.

