

Technische fiche D02 50/50

Bloemrijk grasland voor droge bodems



SAMENSTELLING

Festuca ovina (schapengras)
 Festuca rubra commutata (roodzwenkgras)
 Poa pratensis (veldbeemdgras)
 Rhinanthus minor (kleine ratelaar)
 Achillea millefolium (duizendblad)
 Agrimonia eupatoria (gewone agrimonie)
 Agrostemma githago (bolderik)
 Anthyllis vulneraria (wondklaver)
 Centaurea cyanus - syn. Cyanus segetum
 (korenbloem)
 Centaurea jacea (knoopkruid)
 Centaurea scabiosa (grote centaurie)
 Clinopodium vulgare (borstelkrans)
 Daucus carota (wilde peen)
 Dianthus armeria (ruige anjer)
 Echinops sphaerocephalus (beklierde
 kogeldistel)
 Echium vulgare (slangenkruid)
 Galium verum (geel/echt walstro)
 Hypericum perforatum (Sint-Janskruid)
 Leontodon hispidus (ruige leeuwentand)
 Leucanthemum vulgare (wilde margriet)
 Malva moschata (muskuskaasjeskruid)
 Onobrychis viciifolia (esparcette)



Origanum vulgare (wilde marjolein)
 Papaver rhoeas (grote klaproos)
 Primula veris (gulden sleutelbloem)
 Reseda luteola (wouw)
 Sanguisorba minor - syn. Poterium
 sanguisorba (kleine pimpernel)
 Saponaria officinalis (zeepkruid)
 Silene latifolia alba (avondkoekoeksbloem)
 Silene vulgaris (blaassilene)
 Stachys officinalis - syn. Betonica officinalis
 (betonie)
 Vaccaria hispanica (koekruid)
 Verbascum nigrum (zwarte toorts)

Kenmerken	Meerjarig mengsel + éénjarigen bevat wilde bloemenzaden van regionale oorsprong. Mengsel bestaande uit 50% grassen en 50% inheemse bloemen (vooral vaste planten). Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels
Volwassen hoogte	30-60 cm
Toepassing	Voor grote oppervlaktes
Bodemtype/habitat	Droge bodem
Standplaats	Zonnig
Zaadichtheid	5g/m ²
Zaaiperiode	Februari tot april – augustus tot oktober
Bloeiperiode	Mei tot september
Maai-beheer	Eerste jaar enkel maaien in oktober, daarna 1 tot 2 x per jaar (juli en oktober) met afvoeren van het maaisel.

Vorbereiding terrein

Maak de grond goed proper.

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden. Om dit succesvol te doen bestaan er verschillende technieken:

- Bestaande grasmat afschrapen en afvoeren of herverdelen over een ander deel van het terrein. Dit is de beste methode want hierdoor verwijdert u eveneens het vruchtbaarste deel van de grond;
- De grond meerdere maanden afdekken met een ondoorzichtige folie of karton (hierdoor sterft alles af);
- De grond diep omploegen (grasmat minstens 30 cm onderspitten) – voor de winter;



⚠ Let op :

Indien er op het perceel voordien veel 'lastig' onkruid stond (brandnetels, zuring, distels, winde...) dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan u best twee weken wachten nadat u de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt of brandt u dit allemaal eerst weg en zaait pas nadien het zaadmengsel in – dit zonder de bodem opnieuw te bewerken en om te gooien.

Inzaaien

De zaden mengen met wat zand en uitstrooien over het terrein.

Daarna lichtjes aanharken en aandrukken voor een goed contact met de grond, de zaden mogen nooit afgedekt worden met enkele cm substraat, hoogstens enkele mm.

De bloemenweide mag NIET bemest worden. De periode van inzaaien ligt tussen maart en half juni of van eind augustus tot eind oktober.

De éénjarige zorgt ervoor dat er het eerste jaar na zaaien ook al bloei is.

Zaaidichtheid: 5g/m²

Onderhoud – maaien

Enkel maaien in oktober in het eerste jaar na zaaien, daarna 1 of 2 keer maaien per jaar (begin juli en in oktober). Bij voorkeur maaien met een messenbalk of bosmaaier, vermijd het om te maaien met een klepelmaaier.

Na het maaien kan het maaisel enkele dagen blijven liggen, zodat het rijpe zaad er kan afvallen. Daarna steeds afvoeren van het maaisel om verrijking en verdichting van de bodem te voorkomen.