

Technische fiche D03 70/30

Bloemrijk grasland voor natte bodems



SAMENSTELLING

Alopecurus pratensis (grote vossenstaart)
 Festuca arundinacea (rietzwenkgras)
 Holcus lanatus (gestreepte witbol)
 Phalaris arundinacea (rietgras)
 Poa trivialis (ruw beemdgras)
 Achillea ptarmica (wilde bertram)
 Angelica sylvestris (gewone engelwortel)
 Anthriscus sylvestris (fluitenkruid)
 Centaurea cyanus (korenbloem)
 Centaurea jacea (knoopkruid)
 Eupatorium cannabinum (koninginnekruid)
 Filipendula ulmaria (moerasspirea)
 Galium mollugo (geel walstro)
 Heracleum sphondylium (gewone berenklauw)
 Leucanthemum vulgare (wilde margriet)
 Lythrum salicaria (grote kattenstaart)
 Papaver rhoeas (grote klaproos)



Ranunculus acris (scherpe boterbloem)
 Silene dioica (dagkoekoeksbloem)
 Silene flos-cuculi (echte koekoeksbloem)
 Succisa pratensis (blauwe knoop)
 Tragopogon pratensis (gele morgenster)
 Valeriana officinalis (echte valeriaan)

Kenmerken	<p>Meerjarig mengsel met wilde bloemenzaden van regionale oorsprong Mengsel bestaande uit 70% grassen en 30% inheemse bloemen (vooral vaste planten). Een gedeelte van het mengsel zijn éénjarige bloemen, dit zorgt ervoor dat er het eerste jaar na zaaien ook al bloei is. Duurzaamheid van dit mengsel is ruim groter dan 5 jaar (bij goede aanleg en goed beheer) Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels</p>
Volwassen hoogte	30-60 cm
Toepassing	Grote oppervlaktes
Bodemtype/habitat	Natte bodem en aan de rand van waterlopen.
Standplaats	Zonnig
Zaadichtheid	5g/m ²
Zaaiperiode	Februari tot april – augustus tot oktober
Bloeiperiode	Mei – september
Maaibeheer	<p>Het eerste jaar enkel maaien in oktober, daarna 2x aan het begin van de zomer en aan het einde van de herfst (juli en oktober). Steeds afvoeren van het maaisel.</p>

Vorbereiding terrein

Maak de grond goed proper.

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden. Om dit succesvol te doen bestaan er verschillende technieken:

- Bestaande grasmat afschrapen en afvoeren of herverdelen over een ander deel van het terrein. Dit is de beste methode want hierdoor verwijdert u eveneens het vruchtbaarste deel van de grond;
- De grond meerdere maanden afdekken met een ondoorzichtige folie of karton (hierdoor sterft alles af);
- De grond diep omploegen (grasmat minstens 30 cm onderspitten) – voor de winter;



⚠ Let op : indien er op het perceel voordien veel 'lastig' onkruid stond (brandnetels, zuring, distels, winde,...) dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan u best twee weken wachten nadat u de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt of brandt u dit allemaal eerst weg en zaait pas nadien het zaadmengsel in – dit zonder de bodem opnieuw te bewerken en om te gooien.

Inzaaien

De zaden mengen met wat zand en uitstrooien over het terrein.

Daarna lichtjes aanharken en aandrukken voor een goed contact met de grond, de zaden mogen nooit afgedekt worden met enkele cm substraat, hoogstens enkele mm.

De bloemenweide mag NIET bemest worden.

De periode van inzaaien ligt tussen maart en half juni of van eind augustus tot eind oktober.

Zaaidichtheid: 5g/m²

Onderhoud – maaien

Enkel maaien in oktober in het eerste jaar na zaaien, daarna 2 keer maaien per jaar (begin juli en in oktober).

Bij voorkeur maaien met een messenbalk of bosmaaier, vermijd het om te maaien met een klepelmaaier.

Na het maaien kan het maaisel enkele dagen blijven liggen, zodat het rijpe zaad er kan afvallen.

Daarna steeds afvoeren van het maaisel om verrijking en verdichting van de bodem te voorkomen.