


Technische fiche D04 70/30

Bloemrijk grasland voor overstromingsgebieden en wadi's



SAMENSTELLING

Alopecurus pratensis (grote vossenstaart)
 Festuca arundinacea (rietzwenkgras)
 Festuca rubra commutata (roodzwenkgras)
 Holcus lanatus (gestreepte witbol)
 Poa pratensis (veldbeemdgras)
 Poa trivialis (ruw beemdgras)
 Achillea ptarmica (wilde bertram)
 Agrostemma githago (bolderik)
 Anthriscus sylvestris (fluitenkruid)
 Centaurea cyanus (korenbloem)
 Centaurea jacea (knoopkruid)
 Galium mollugo (geel walstro)
 Geranium pyrenaicum (bermoovaarsbek)
 Heracleum sphondylium (gewone berenklauw)
 Leucanthemum vulgare (wilde margriet)
 Papaver rhoeas (grote klaproos)
 Pulicaria dysenterica (heelblaadjes)
 Ranunculus acris (scherpe boterbloem)



Rumex acetosa (veldzuring)
 Silene dioica (dagkoekoeksbloem)
 Silene flos-cuculi (echte koekoeksbloem)
 Succisa pratensis (blauwe knoop)
 Tragopogon pratensis (gele morgenster)
 Valeriana officinalis (echte valeriaan)

Kenmerken	Meerjarig en éénjarig mengsel met wilde bloemenzaden van regionale oorsprong. Mengsel bestaande uit 70% grassen en 30% inheemse bloemen (vooral vaste planten) Een gedeelte van het mengsel zijn éénjarige bloemen, dit zorgt ervoor dat er het eerste jaar na zaaien ook al bloei is Duurzaamheid van dit mengsel is ruim groter dan 5 jaar (bij goede aanleg en goed beheer). Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels
Volwassen hoogte	30-60 cm
Toepassing	Voor bodems die in de winter kunnen overstromen of erg nat zijn en in de zomer droog komen te staan.
Bodemtype/habitat	Vochtig/nat moerassig / Wadi
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw
Zaadichtheid	5g/m ²
Zaaiperiode	Maart tot mei – augustus tot oktober
Bloeiperiode	Mei – september
Maaibeheer	Enkel maaien in oktober-november in het eerste jaar na zaaien, daarna 2 keer maaien per jaar (begin juli en in oktober-november).

Vorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Om dit succesvol te doen bestaan er verschillende technieken:

- Bestaande grasmat afschrapen en afvoeren of herverdelen over een ander deel van het terrein. Dit is de beste methode want hierdoor verwijdert u eveneens het vruchtbaarste deel van de grond;
- De grond meerdere maanden afdekken met een ondoorzichtige folie of karton (hierdoor sterft alles af);
- De grond diep omploegen (grasmat minstens 30 cm onderspitten) – voor de winter;



⚠ **Let op** : indien er op het perceel voordien veel 'lastig' onkruid stond (brandnetels, zuring, distels, winde,...) dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan u best twee weken wachten nadat u de grond voor het eerst bewerkt hebt. Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt of brandt u dit allemaal eerst weg en zaait pas nadien het zaadmengsel in – dit zonder de bodem opnieuw te bewerken en om te gooien.

Inzaaien

De zaden mengen met wat zand en uitstrooien over het terrein.

Daarna lichtjes aanharken en aandrukken voor een goed contact met de grond, de zaden mogen nooit afgedekt worden met enkele cm substraat, hoogstens enkele mm.

De bloemenweide mag NIET bemest worden.

De periode van inzaaien ligt tussen maart en half juni of van eind augustus tot eind oktober.

Zaaidichtheid: 5g/m²

Onderhoud – maaien

Enkel maaien in oktober-november in het eerste jaar na zaaien, daarna 2 keer maaien per jaar (begin juli en in oktober-november).

Bij voorkeur maaien met een messenbalk of bosmaaier, vermijd het om te maaien met een klepelmaaier.

Na het maaien kan het maaisel enkel dagen blijven liggen, zodat het rijpe zaad er kan afvallen. Daarna steeds afvoeren van het maaisel om verrijking en verdichting van de bodem te voorkomen.