

Technische fiche Biodivers gazon E01



SAMENSTELLING

Grassen 95%

Agrostis capillaris/tenuis syn A. pumil A. tenuis (gewoon struisgras)
Festuca rubra commutata (gewoon rood zwenkgras)
Lolium perenne (Engels raaigras)
Poa pratensis (veldbeemdgras)

Bloemen 5%

Achillea millefolium (duizendblad)
Bellis perennis (madeliefje)
Centaurea jacea (echt knoopkruid)
Hypochaeris radicata (gewoon biggenkruid)
Leontodon hispidus subsp. hispidus (ruige leeuwentand)
Leucanthemum vulgare (wilde margriet)
Lotus corniculatus (gewone rolklaver)
Medicago lupulina (hopklaver)
Prunella vulgaris (gewone brunel)
Trifolium repens (witte klaver)
Veronica chamaedrys (gewone ereprijs)



Kenmerken	Meerjarig mengsel bedoeld om biodiverse gazons te ontwikkelen. De soorten in dit mengsel verdragen regelmatig maaien, zijn laagblijvend en bestand tegen betreding. Mengsel bestaande uit 95% grassen en 5% inheemse bloemenzaden. Minder frequent te maaien in vergelijking met een klassiek gazon. Aantrekkelijk voor bestuivers en andere insecten.
Volwassen hoogte	Afhankelijk van het aantal maaibeurten 0-10cm tot 10-30 cm
Toepassing	Tuinen, parken, recreatieve grasvelden, bedrijventerreinen, en ander extensief gebruikt openbaar groen. Ook geschikt voor wandelpaden, speelzones, hondenlosloopzones die niet intensief belast worden, onderbegroeiing in jonge voedselbossen, boomgaarden en agroforestry-systemen.
Bodemtype/habitat	Zand, zandleem, leem, klei, humusrijk
Standplaats	Zon, halfschaduw, schaduw
Zaaidichtheid	25g/m ²
Zaaiperiode	Maart tot mei – augustus tot oktober
Bloeiperiode	Mei tot september
Maaibeheer	Om de 2 tot 3 weken op een hoogte van minstens 8cm, afvoeren van maaisel.

Voorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Indien er op het perceel voordien veel onkruid staat dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan u best twee weken wachten nadat u de grond voor het eerst bewerkt hebt. Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg en zaait pas nadien het zaadmengsel in – dit zonder de bodem opnieuw te bewerken en om te gooien.



Inzaaien

Breedwerpig zaaien en licht inwerken en aanrollen na het zaaien.

Niet bemesten.

Aanbrengen van compost enkel te overwegen bij zeer droge mineraalarme gronden (max 2 cm).

De periode van inzaaien ligt tussen maart en half juni of van eind augustus tot half oktober

Zaaidichtheid: 25g/m²

Onderhoud – maaien

In het voorjaar (tot half juli) om de 2 tot 3 weken maaien op een hoogte van minstens 8 cm, met afvoeren van het maaisel.

Daarna kan je minder of niet meer maaien tot midden september.

Tip!

Maai enkele stroken of eilandjes minder. Zo zullen hoger bloeiende soorten zoals margriet en knoopkruid zich hier meer ontwikkelen en uitbundiger bloeien.