

Technische fiche E02 95/5

Biodivers gazon – droge bodem - betredingsmengsel



SAMENSTELLING

Festuca arundinaceae (rietzwenkgras)
 Festuca ovina (schapengras)
 Festuca rubra commutata (gewoon rood zwenkgras)
 Festuca rubra trichophylla (rood zwenkgras)
 Lolium perenne (Engels raaigras)
 Poa compressa (plat beemdgras)
 Poa pratensis (veldbeemdgras)
 Achillea millefolium (duizendblad)
 Bellis perennis (madeliefje)
 Hieracium pilosella (muizenoor)
 Medicago lupulina (hopklaver)
 Papaver argemone (ruige klaproos)
 Prunella vulgaris (gewone brunel)
 Thymus pulegioides (grote tijm)
 Trifolium repens (witte klaver)



Kenmerken	<p>Dit mengsel is ontwikkeld om gangpaden te vergroenen en zo het gebruik van herbiciden of veelvuldig wieden te voorkomen. Dit mengsel wordt onder meer toegepast in gangpaden van kerkhoven.</p> <p>Mengsel bestaande uit 95% grassen en 5% inheemse bloemenzaden.</p> <p>De soorten in het mengsel zijn laagblijvend en bestand tegen betreding, dit voor een vlotte betreding.</p> <p>Naast minder zwaar beheer (gedifferentieerd beheer), is dit mengsel een bron van voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten.</p>
Volwassen hoogte	0-10cm
Toepassing	Geschikt om gangpaden te vergroenen, toepassing o.a. begraafplaatsen.
Bodemtype/habitat	Zand, zandleem, leem, klei, humusrijk
Standplaats	Zon, halfschaduw, schaduw
Zaadichtheid	30g/m ²
Zaaiperiode	Maart tot mei – september tot oktober
Bloeiperiode	Mei tot september
Maaibeheer	Maaien gebeurt 5 tot 8 keren per jaar. Steeds afvoeren van het maaisel.

Vorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Indien er op het perceel voordien veel onkruid staat dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan u best twee weken wachten nadat u de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg en zaait pas nadien het zaadmengsel in – dit zonder de bodem opnieuw te bewerken en om te gooien.

Inzaaien

De zaden breedwerpig zaaien en licht inwerken na het zaaien.

Niet bemesten en geen compost aanbrengen.

De periode van inzaaien ligt tussen maart en half juni of van eind augustus tot half oktober.

Zaaidichtheid: 30g/m²

Onderhoud – maaien

In het voorjaar (tot half juli) om de 2 tot 3 weken maaien op een hoogte van minstens 8 cm, met afvoeren van het maaisel.

Daarna kan je minder of niet meer maaien tot midden september.

