

Technische fiche E03 97/3

Biodivers weidemengsel – betredings- en begrazingsmengsel



SAMENSTELLING

Festuca pratensis (beemdlangbloem)
 Festuca rubra rubra (roodzwenkgras)
 Lolium perenne (Engels raaigras)
 Phleum pratense (timoteegras)
 Poa pratensis (veldbeemdgras)
 Dactylis glomerata (kropaar)
 Achillea millefolium (duizendblad)
 Carum carvi (karwij)
 Centaurea jacea (knoopkruid)
 Leucanthemum vulgare (wilde margriet)
 Plantago lanceolata (smalle weegbree)
 Sanguisorba minor (kleine pimpernel) Syn. Poterium sanguisorba
 Trifolium repens (witte klaver)



Kenmerken	<p>Meerjarig mengsel bestaande uit 97% grassen en 3% inheemse bloemen. Voor de ontwikkeling van een kruidenrijk weiland dat zorgt voor evenwichtig voedsel voor de begrazers (paarden en andere hoefdieren) en ook aantrekkelijk is voor insecten en vogels.</p> <p>Het 1^e jaar na zaaien weinig bloei, daarna ingetogen bloei van de vaste planten. Kan dienen om te hooien.</p> <p>Begrazing van de weide vermijden in het 1^e jaar na zaaien, om ervoor te zorgen dat de planten goed kunnen ontwikkelen.</p> <p>Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.</p>
Volwassen hoogte	<p>Hoogte afhankelijk van het aantal maai beurten</p> <p>0 - 10 cm, 10 - 30 cm, 30 - 60 cm</p>
Toepassing	Ontwikkeling kruidenrijk weiland, droog normaal of vochtige grond
Bodemtype/habitat	Zand, zandleem, leem, klei, humusrijk
Standplaats	Zon, halfschaduw, schaduw
Zaadichtheid	4g/m ²
Zaaiperiode	Maart tot mei – september tot oktober
Bloeiperiode	Mei tot september
Maaibeheer	Jaarlijks 1 tot 2x maaien met afvoeren van het maaisel.

Vorbereiding terrein

Verwijderen van zoveel mogelijk bestaande grassen en onkruiden.

Om dit succesvol te doen bestaan er verschillende technieken:

- Bestaande grasmat afschrapen en afvoeren of herverdelen over een ander deel van het terrein. Dit is de beste methode want hierdoor verwijderd u eveneens het vruchtbaarste deel van de grond;
- De grond meerdere maanden afdekken met een ondoorzichtige folie of karton (hierdoor sterft alles af);
- De grond diep omploegen (grasmat minstens 30 cm onderspitten) – voor de winter;



⚠ Let op : indien er op het perceel voordien veel 'lastig' onkruid stond (brandnetels, zuring, distels, winde,...) dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken.

Concreet kan u best twee weken wachten nadat u de grond voor het eerst bewerkt hebt.

Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt of brandt u dit allemaal eerst weg en zaait pas nadien het zaadmengsel in – dit zonder de bodem opnieuw te bewerken en om te gooien.

Inzaaien

De zaden mengen met zand en uitstrooien over het terrein.

Daarna lichtjes aanharken en aandrukken voor een goed contact met de grond, de zaden mogen nooit afgedekt worden met enkele cm substraat, hoogstens enkele mm.

De bloemenweide mag NIET bemest worden.

De periode van inzaaien ligt tussen maart en midden mei of van eind augustus tot eind oktober.

Zaaidichtheid: 4g/m²

Onderhoud – maaien

Jaarlijks 1 tot 2 keer maaien met afvoeren van het maaisel. Het maaisel kan worden gebruikt als hooi.

Maaien gebeurt bij voorkeur gefaseerd*, zodat er steeds verse groei en bloei is voor de begrazers en aanwezige fauna. (*een deel van de oppervlakte niet maaien)